

STE SORULARI / QUESTIONS OF CME

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorular, TOTBİD TOTEK Yönetim Kurulu tarafından dergi editörlüğümüze yollanan mektup doğrultusunda, bundan sonraki tüm sayılarda yer alacaktır. Bu soruların tamamı, dergide yer alan makalelerle ilgili olup, yazarları tarafından hazırlanmıştır. Bu sorulara cevap verebilmeniz için ilgili yayını okumanız gereklidir. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan bu testi cevapladıktan sonra, cevaplarınızı editor@jtss.org veya cutku@ada.net.tr adresine yollayınız. Doğru sayınız gizli tutulacak, sonuç sadece size yollanacaktır. En derin saygılarımızla.

- 1- Yıldırım ve arkadaşlarının çalışmasında korse uygulamasının yapıldığı skolyoz tipi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Lenke Tip-I
 - b) Lenke Tip-II
 - c) Lenke Tip-III
 - d) Lenke Tip-IV
 - e) Lenke Tip-V
- 2- Yıldırım ve arkadaşlarının çalışmasında korse uygulaması sonrasında eğrilikteki nihaiyi sonuçlar ne olmuştur?
 - a) % 50 üzeri düzelme
 - b) Eğilme grafisinde elde edilen düzelmemim iki katı
 - c) Eğilme grafisinde elde edilen düzelmemim üç katı
 - d) Tedaviye başladığı eğrilik derecesine yakın
 - e) Tedaviye başladığı eğrilik derecesinin yarısı
- 3- Akesen ve arkadaşlarının çalışmasında kaç hastanın kaç pedikülüne uygulama yapılmıştır?
 - a) 25 hastanın 150 pedikülüne
 - b) 24 hastanın 135 pedikülüne
 - c) 23 hastanın 131 pedikülüne
 - d) 22 hastanın 126 pedikülüne
 - e) 21 Hastanın 104 pedikülüne
- 4- Çapar ve arkadaşlarının çalışmasında adölesan hastalarda ölçülen pedikül çaplarına göre en uygun vida çapı piyasadakilerden hangisi kullanılabilir?
 - a) Kızlarda 3.0 mm ve erkeklerde 4.0 mm'lik
 - b) Kızlarda 3.5 mm ve erkeklerde 4.5 mm'lik
 - c) Kızlarda 4.0 mm ve erkeklerde 5.0 mm'lik
 - d) Kızlarda 4.5 mm ve erkeklerde 5.5 mm'lik
 - e) Kızlarda 5.0 mm ve erkeklerde 6.0 mm'lik
- 5- Çapar ve arkadaşlarının çalışmasına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 - a) Sağ ve sol pedikül çaplarının ortalamaları istatistikî olarak benzer bulunmuştur.
 - b) T-12 ve L-1 pedikül çaplarının ortalamaları istatistikî olarak benzer bulunmuştur.
 - c) Erişkin erkek ve kadınlarda T-12 pedikül çaplarının ortalamaları istatistikî olarak farklı bulunmuştur.
 - d) Adölesan ve erişkin erkeklerde T-12 pedikül çaplarının ortalamaları istatistikî olarak farklı bulunmuştur.
 - e) Adölesan erkek ve kızlarda L-1 pedikül çaplarının ortalamaları istatistikî olarak benzer bulunmuştur.

6- Çift Demir ve arkadaşlarının çalışmasında servikal faset çıkığı olan olgularda nörolojik komplikasyonların önlenmesi için en önemli girişim nedir?

- a) Faset çıkığının hemen açık redüksiyonu
- b) Faset çıkıklarının 3 gün sonra kapalı redüksiyonu
- c) Varsa yaralanmış diskin çıkartılması
- d) Fasetlerin aynı gün tellenmesi
- e) Erken faset füzyonu

7- Çift Demir ve arkadaşlarının çalışmasında servikal faset çıkığı olan olguların yüzde kaçına anterior diskektomi ve anterior-posterior füzyon uygulanmıştır?

- a) 12
- b) 22
- c) 30
- d) 42
- e) 52

8- Ahmet Özgür Yıldırım ve arkadaşlarının çalışmasında yer alan 26 hastadan kaç tanesi vertebra kırığının konservatif olarak tedavisinden sonra işe dönememiştir?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

9- Aşağıdakilerden hangisi, Ergün Karavelioğlu'nun olgu sunumunda takdim ettiği medulla spinalis yaralanmasına yol açmıştır?

- a) Makas
- b) Ateşli silah mermisi
- c) Şarapnel parçası
- d) İnşaat demiri
- e) Bıçak

10- Demirkıran ve arkadaşlarının idiyopatik skolyoz etiopatolojisine yönelik derleme çalışmalarına göre bu gün üzerinde en çok çalışılan ve inanılan etiyolojik faktör aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Prematüre doğum
- b) Vibrasyon duyusunda bozukluk
- c) Görme kusurları
- d) Genetik multijenik geçiş
- e) Nöromusküler bozukluk

JTSS 22(3) SAYISI
STE SORULARI DOĞRU CEVAPLARI:

1-c	6-b
2-e	7-e
3-c	8-d
4-a	9-b
5-d	10-d